



โรคติดเชื่อไวรัสซิกา

ภัยเงียบจาก ยุงลาย

“โรคติดเชื่อไวรัสซิกา หรือ โรคไขซิกา” เกิดจากการติดเชื่อไวรัสซิกา อยู่ในตระกูลฟลิวไวรัส (flavivirus) มีลักษณะคล้ายคลึงกับ ไวรัสไข้เหลือง, ไวรัสแดงก, ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี มีขยลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ส่วนใหญ่อัปรยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์


อาการ




มีไข้



ปวดศีรษะ



ตาแดง



มีผื่นแดง



ปวดข้อ
ปวดกล้ามเนื้อ



หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา 2 -7 วัน



ปกติ



ผิดปกติ

การติดเชื่อโนสตรี้มีครรภ์ อาจทำให้เกิดภาวะศีรษะเล็กในเด็กแรกเกิด (Microcephaly)

การรักษา

ส่วนใหญ่อมีอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดย...



1 พักผ่อนให้เพียงพอ



2 ดื่มน้ำมาก ๆ



3 หากมีไข้ให้กินยาพาราเซตามอล ห้ามกินแอสไพริน

> หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ <

การป้องกัน



1 เก็บบ้าน ให้สะอาดปลอดโปร่ง



2 เก็บขยะ คัดแยกขยะ และทิ้งให้เรียบร้อย



3 เก็บน้ำ ปิดภาชนะให้สนิท หรือเทน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่และอาศัยอยู่ในบ้าน



ขอขอบคุณข้อมูลจาก กองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กองสาธารณสุขท้องถิ่น : กลุ่มงานป้องกันโรค

สแกนด้วย CamScanner